JOELHO

PROF. DR. Wouber Héricksen de B. Vieira
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA - UFRN
hericksonfisio@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

- Mais complexa articulação do corpo
- Local mais comum de lesões desportivas
- Resiste a grandes forças de suporte (peso corporal)
- Fornece grande estabilidade vs grande ADM
- Reúne as duas maiores alavancas corporais

ESTRUTURA ÓSSEA

- Reconhece-se três articulações diferentes:
 - Entre os côndilos medial da tíbia e fêmur,
 - Entre os côndilos laterais da tíbia e fêmur
 - Entre a patela e o fêmur
- Todas as articulações encontram-se reunidas dentro de uma cápsula articular comum.

ESTRUTURA ÓSSEA

ESTRUTURA ÓSSEA

- Côndilos lateral e medial do fêmur
- Côndilos lateral e medial da tíbia
- Fossa intercondilar
- Superfície patelar
- Eminência (tubérculos) intercondilar
- Articulação tibiofibular proximal

ESTRUTURA ÓSSEA

- **PATELA:**
 - Osso triangular com ápice voltado para baixo
 - Possui as superfícies anterior e posterior
 - Protege a face anterior do joelho, centraliza forças e aumenta o ângulo de inserção tendão patelar → VANTAGEM MECÂNICA
 - A retirada da patela leva a uma perda de cerca de 50% no torque extensor do joelho
 - ÂNGULO Q → VETOR VALGO

ESTRUTURA ÓSSEA

ÂNGULO Q (12°) e (16°)

GENU VALGO X VARO
(plano frontal)

- Abertura lateral entre o fêmur e a tibia de cerca de 170° = Vetor valgo

VETOR RESULTANTE
Fatores determinantes (estruturais x funcionais)
Implicação clínica

LIGAMENTOS

LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA):

- Importante estabilizador do joelho
- Vai da área anterior da tibia, para cima e para trás, até a fossa intercondilar do fêmur
- Evita a anteriorização da tibia sobre o fêmur, a hiperextensão e o valgo do joelho

LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP):

- Vai da área intercondilar posterior da tibia para cima e para frente, até a fossa intercondilar do fêmur
- Evita a posteriorização da tibia sobre o fêmur e a hiperextensão

LIGAMENTOS

LIGAMENTOS

LIGAMENTO COLATERAL TIBIAL (MEDIAL):

- Na face medial do joelho, une o côndilo medial da tibia e do fêmur
- Limita o valgo

LIGAMENTO COLATERAL FIBULAR (LATERAL):

- Na face lateral do joelho, une o côndilo lateral do fêmur à cabeça de fíbula
- Limita o varo

LIGAMENTO POPLÍTEO ARQUEADO:

- Une a tibia ao fêmur posteriormente

LIGAMENTO POPLÍTEO OBLÍQUO:

- Junto com o arqueado, dão estabilidade posterior ao joelho

LIGAMENTOS

MENISCOS

▪ Em número de dois, são cartilagens resistentes em forma de meia-lua

- Adaptam os côndilos femorais aos tibiais
- Amortece choques na marcha e no salto
- Reduz o desgaste articular
- Facilita os movimentos articulares

MENISCOS

- O menisco medial é maior que o lateral
- Ambos os meniscos são mais espessos nos bordos periféricos
- A vascularização é mais abundante na periferia
- O menisco lateral é mais móvel que o medial
- Os meniscos estão unidos anteriormente pelo ligamento transverso

MENISCOS

ANATOMIA VASCULAR E NEURAL

MENISCOS

- A meniscectomia reduz a área de contato tibio-femural em cerca de 50%

OUTRAS ESTRUTURAS

CARTILAGEM ARTICULAR:

- Recobre todas as superfícies articulares do joelho
- A cartilagem da patela é a mais espessa do corpo e possui cerca de 5mm de espessura.

CÁPSULA ARTICULAR:

- É bastante extensa, vascularizada e revestida por uma membrana sinovial

▪ **TRATO ÍLIO-TIBIAL:**

- Importante estabilizador lateral

▪ **RETINÁCULOS MEDIAL E LATERAL:**

- Estabilizadores

OUTRAS ESTRUTURAS

▪ **PLICA SINOVIAL:**

- Presente em cerca de 20 a 60% da população.
- São resquícios embrionários do processo de formação do joelho. A superomedial é clinicamente a mais importante

▪ **BOLSAS SINOVIAS:**

- Há numerosas bolsas, que se comunicam com a cavidade articular principal:
 - **Supra-patelar:** profunda, abaixo do TQ
 - **Infra-patelar:** duas, abaixo da patela
 - **Pré-patelar:** superficial, entre a patela e a pele
 - **Poplítea:** face posterior do joelho

BOLSAS SINOVIAS

MOVIMENTOS DO JOELHO

▪ **FLEXÃO (140°):**

- Aproximação das faces posteriores da coxa e perna
- A ADM é limitada pelo contato das massas musculares
- Com o quadril estendido, essa ADM pode diminuir

▪ **EXTENSÃO:**

- Retorno da flexão à posição anatômica
- A hiperextensão, quando ocorre, geralmente não ultrapassa 15° (genurecurvatum)

- Limitada pela tensão cápsulo-ligamentar

▪ **ROTAÇÃO:**

- Não ocorre com o joelho estendido
- A máxima rotação ocorre a 90° (frouxidão cápsulo-ligamentar)

MOVIMENTOS DO JOELHO

- A ADM de rotação, normalmente, se situa entre 60 e 90°

- A rotação lateral é o dobro da medial

- O movimento de rotação com o pé fixo ocorre em várias atividades

- Quando o joelho estende, a tibia roda lateralmente sobre o fêmur fixo (rotação terminal do joelho), levando a um "travamento" da articulação.

MÚSCULOS QUE ATUAM SOBRE O JOELHO

QUADRÍCEPS FEMORAL *reto femoral*

- Grande músculo localizado no centro da coxa
- **O:** EIAI
- **I:** bordo superior da patela e tendão patelar
- **A:** Motor primário da flexão do quadril e da extensão do joelho.
- - A ação isolada deste músculo causa os dois movimentos simultaneamente ("músculo do chute")

RETO FEMORAL

QUADRÍCEPS FEMORAL *vasto lateral*

- Maior das quatro porções do quadríceps, localizada na metade inferior da face lateral da coxa. Anatomicamente e funcionalmente, se divide nas porções longa e oblíqua
- **Q:** face lateral da metade superior da linha áspera
- **I:** bordo súpero lateral da patela, tendão patelar e retináculo lateral
- **A:** Motor primário da extensão do joelho. Tende a tracionar a patela lateralmente

VASTO LATERAL

QUADRÍCEPS FEMORAL *vasto medial*

- Localizado na face medial da coxa. Subdivide-se nas porções longa e oblíqua
- **Q:** Toda a extensão da linha áspera
- **I:** Bordo súpero-medial da patela, retináculo medial e tendão patelar
- **A:** Motor primário da extensão do joelho. Sua tração medializa a patela em oposição a ação do vasto lateral
- Extensor do últimos graus do joelho??? **NÃO!**

VASTO MEDIAL

QUADRÍCEPS FEMORAL *vasto intermédio*

- Localiza-se entre o vasto lateral e o medial, debaixo do reto femoral. Suas fibras encontram-se paralelo ao eixo longitudinal do fêmur
- **Q:** Face ântero-lateral do fêmur
- **I:** Bordo superior da patela
- **A:** Motor primário da extensão do joelho. Como o RF, traciona a patela diretamente para cima

VASTO INTERMÉDIO

QUADRÍCEPS FEMORAL

- Todas as porções do quadríceps são inervados pelo Nervo Femoral
- O tendão quadriciptal insere-se acima e aos lados da patela. Do ápice da patela, o tendão (ligamento) patelar estende-se até a tuberosidade da tíbia
- Existe uma outra divisão do quadríceps (do Vasto Intermédio), conhecida como músculo articular do joelho, tensor da sinóvia ou ainda subcruval (função)

BÍCEPS FEMORAL

- Assemelha-se, na sua estrutura, ao bíceps braquial
- **Q:** PL: tuberosidade isquiática; PC: na linha áspera
- **I:** Côndilo lateral da tíbia e cabeça da fíbula
- **N:** Nervo Isquiático
- **A:** Somente a porção longa atua sobre o quadril (motor primário da extensão).
- Ambas as porções são motoras primárias da flexão e rotação lateral do joelho

BÍCEPS FEMORAL

SEMITENDINOSO

- Tem esse nome devido ao seu longo tendão de inserção
- **Q**: Tuberosidade Isquiática
- **I**: Parte superior da face ântero-medial da tibia (*pata de ganso*)
- **N**: Nervo Isquiático
- **A**: extensão do quadril. No joelho é motor primário da flexão e rotação medial

SEMITENDINOSO

SEMIMEMBRANOSO

- Localizado na face póstero-medial da coxa, tem esse nome devido ao seu tendão de inserção membranoso.
- **Q**: Tuberosidade isquiática
- **I**: Face posterior do côndilo medial da tibia
- **N**: Nervo isquiático
- **A**: Estende o quadril, flete e roda medialmente o joelho

SEMIMEMBRANOSO

POPLÍTEO

- Pequeno músculo localizado na região posterior do joelho
- O**: Face lateral do côndilo lateral do fêmur
- I**: Região pósteromedial da tibia
- N**: Nervo Tibial
- A**: Rotação Medial da tibia.
- Destrava a articulação no início da flexão do joelho, e a estabiliza quando estamos de pé.

POPLÍTEO

OUTROS MÚSCULOS

- Sartório**: flexor e rotador medial do joelho
- Grácil**: flexor e rotador medial do joelho
- Gastrocnêmio**: flexor do joelho (será visto no tornozelo)

ANÁLISE CINESIOLÓGICA

- Nos movimentos de flexo-extensão, não ocorrem rolamento puro: o rolamento predomina no início da flexão e o deslizamento no final

- Os ligamentos colaterais tornam-se tensos durante a extensão e froucos com a flexão
- Os ligamentos cruzados fornecem estabilidade ao longo de toda ADM
- A mobilidade meniscal durante a flexo-extensão é de aproximadamente 6mm para o menisco medial e de 12mm para o lateral. Eles auxiliam o movimento

- Durante a flexo-extensão, a patela desliza no sentido crânio-caudal
- Quando o joelho é estendido ela se move para cima.
- Quando a articulação está completamente fletida ela se situa no sulco intercondilar
- Tensão patelofemoral

FORÇA DE REAÇÃO PATELOFEMORAL

Equação de Maquet: $FRFP = \sqrt{Fq^2 + Fp^2 + 2FqFp\cos\gamma}$

FORÇA DE REAÇÃO PATELOFEMORAL implicação clínica

FORÇA DE REAÇÃO PATELOFEMORAL implicação clínica

ÁREAS E REGIÕES DE CONTATO DA PATELA E O FEMUR

ESTRESSE PATELOFEMORAL – CCA e CCA implicação clínica

ESTRESSE = FRFP / ÁREA DE CONTATO

ÂNGULO Q (12°) e (16°)

GENU VALGO X VARO
(plano frontal)

- Abertura lateral entre o fêmur e a tibia de cerca de 170° = Vetor valgo

VETOR RESULTANTE
Fatores determinantes (estruturais x funcionais)
Implicação clínica

The Influence of Altered Lower-Extremity Kinematics on Patellofemoral Joint Dysfunction: A Theoretical Perspective

Christopher M. Powers, PT, PhD¹

Patellofemoral Kinematics During Weight-Bearing and Non-Weight-Bearing Knee Extension in Persons With Lateral Subluxation of the Patella: A Preliminary Study

Christopher M. Powers, PT, PhD¹
Suzanne D. Moud, DPT²
Nicholas F. Christensen, MD^{3*}
Mark G. Clifton, PT, MS⁴
Frank C. Spinella, PhD⁵

J Orthop Sports Phys Ther • Volume 33 • Number 11 • November 2003

VALGO DO JOELHO

Sem suporte de peso corporal

com suporte de peso corporal

CHRISTOPHER M. POWERS, PT, PhD¹

The Influence of Abnormal Hip Mechanics on Knee Injury: A Biomechanical Perspective

FRAQUEZA DE ESTABILIZADORES DA Pelve

THERESA H. NAKAGAWA, PT, MS¹ • ERIKA T.J. MORIYA² • CARLOS D. MACIEL, PhD³ • FÁBIO V. SERRÃO, PT, PhD⁴

Trunk, Pelvis, Hip, and Knee Kinematics, Hip Strength, and Gluteal Muscle Activation During a Single-Leg Squat in Males and Females With and Without Patellofemoral Pain Syndrome

TABLE 2	MAXIMUM EXCURSION OF TRUNK, PELVIS, HIP, AND KNEE IN MALES AND FEMALES WITH AND WITHOUT PATELLOFEMORAL PAIN SYNDROME*							
	Female PFPs (n = 20)	Male PFPs (n = 20)	Female Controls (n = 20)	Male Controls (n = 20)	Females (n = 40)	Males (n = 40)	PFPs (n = 40)	Controls (n = 40)
Isolateral trunk lean	11.1 ± 4.6	7.5 ± 3.9	7.5 ± 3.5	6.4 ± 2.3	9.5 ± 4.5 [†]	6.6 ± 3.2	9.3 ± 5.3 [†]	6.7 ± 3.0
Contralateral pelvic drop	11.3 ± 4.3	9.2 ± 4.6	6.6 ± 2.9	7.1 ± 4.5	9.0 ± 4.3	8.6 ± 4.2	10.3 ± 4.7 [†]	7.4 ± 3.8
Hip adduction	20.4 ± 6.0	13.9 ± 7.3	14.3 ± 4.6	7.2 ± 3.8	17.8 ± 6.1 [†]	10.5 ± 5.7	14.8 ± 7.9 [†]	10.8 ± 5.6
Hip internal rotation	15.6 ± 5.8 [†]	9.8 ± 4.8	9.7 ± 5.4	9.5 ± 4.3	12.8 ± 5.5	9.7 ± 4.4	12.7 ± 6.1 [†]	9.6 ± 5.1
Knee abduction	11.2 ± 4.6	7.1 ± 3.5	7.2 ± 3.3	4.2 ± 2.3	9.2 ± 4.1 [†]	5.4 ± 3.2	9.2 ± 6.0 [†]	5.8 ± 3.4

Abbreviations: PFPs, patellofemoral pain syndrome.
[†]Data are mean ± SD deg.
[†]Female PFPs significantly greater than male PFPs and controls (P < .05).
[†]Females significantly different from males (P < .05).
[†]Subjects with PFPs significantly different from controls (P < .05).

FIGURE 3. Mean $\pm$ SD maximum excursion of ipsilateral trunk lean in males and females with and without PFPS. Significant sex and PFPS status main effects were observed. Abbreviation: PFPS, patellofemoral pain syndrome. *Females significantly greater than males ($P < .05$). †Subjects with PFPS significantly greater than controls ($P < .05$).

ALTERAÇÕES BIOMECÂNICAS DO MI

CARGA NA ARTICULAÇÃO DO JOELHO E OA

Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2013

PAPEL DO MOMENTO ADUTOR externo do JOELHO (MAJ)

$$MAJ = \text{Força de Reação do Solo (FRS)} \times \text{Distância (d)}$$

(BRAÇO DE ALAVANCA)

CARGA NA ARTICULAÇÃO DO JOELHO E OA

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO de descarga e MAJ

KNEE ADDUCTION MOMENT

CARGA NA ARTICULAÇÃO DO JOELHO E OA

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO de descarga e MAJ

IMPORTÂNCIA DO ALINHAMENTO DO JOELHO

- Um ângulo Q menor que O "NORMAL" é considerado genuvaro, e um maior, genuvalgo.
- A hiperextensão depende da frouidão capsulo-ligamentar e é referida como genurecurvatum

- O quadríceps é o mais potente grupo muscular do corpo. Ele é o único músculo capaz de estender o joelho
- Devido a ação do RF, o músculo aumenta a sua atividade com a extensão do quadril
- A teoria que o VM é responsável pelos últimos graus de extensão do joelho foi contestada, comprovando-se que as quatro porções agem mais ou menos em conjunto durante toda ADM.

- Todos os vastos atuam mais, em cadeia cinemática aberta, nos últimos graus de extensão, devido a fatores biomecânicos

- Os motores primários da flexão do joelho são os ísquios-tibiais. Sartório, Grácil e Gastrocnêmio são acessórios
- O grupo flexor gera cerca de 2/3 do torque produzido pelo extensor

- O Semimembranoso, o Semitendinoso e o Poplíteo são motores primários da rotação medial. Sartório e Grácil assessoram.
- O bíceps femoral é rotador lateral. O TFL pode assessorar.

- A função principal do poplíteo é destravar a articulação do joelho no início da flexão
- Vários músculos que atuam sobre o joelho são biarticulares. Assim a posição do quadril influencia na atividade destes músculos
 - Extensão do joelho com Flexão do quadril
 - Flexão do joelho com Extensão do quadril
 - Flexão do joelho com Flexão do quadril
 - Extensão do joelho com Extensão do quadril

Influência da posição do tronco no plano sagital estresse patelofemoral

Um pouco mais de clínica...

Tríade infeliz...

Lesões: LCA, LCM e menisco medial

JOELHO DE SALTADOR

Iliotibial Band Syndrome

- Afecção comum no joelho
- Fisicamente ativo - Sexo feminino
- 20-40% lesões do joelho no ambiente clínico

- Dor anterior e/ou retropatelar;
- Início insidioso;
- EXACERBAÇÃO: sentado e/ou atividades com descarga de peso sobre os joelhos fletidos

MULTIFATORIAL

- Fraqueza e/ou atrofia do VMO*
- Joelho valgo*
- Torção tibial externa
- Hiperpronação subtalar
- Displasia troclear
- Patela alta*
- Retração do TIT

FRAQUEZA DOS MM. ABDUTORES E ROTADORES LATERAIS

Articulação patelofemoral X SDPF X OA "saindo do trilho"

Mal alinhamento patelar
Deslocamento anormal da patela
↑ ESTRESSE PATELOFEMORAL
DEGENERAÇÃO DA CARTILAGEM
→ OA PATELOFEMORAL

Condropatia patelar

Lesões meniscais

OBRIGADO!