PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* – EDUCAÇÃO FÍSICA

Universidade
Católica de Brasília

HIV E EXERCÍCIO

PROF. DR. JONATO PRESTES

VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV)

A microscopic image of HIV virus particles, showing two spherical particles with a textured surface and numerous thin, hair-like projections (spikes) extending from them. The particles are colored in shades of yellow and cyan against a dark background.

- Síndrome da imunodeficiência adquirida (**AIDS**):
 - 1) CAUSADA PELO HIV
 - 2) ASPECTOS CLÍNICOS: imunodepressão com infecções oportunistas, perda de peso e degeneração do sistema nervoso central (SNC)

GLOBAL HIV/AIDS RESPONSE

Epidemic update and health sector
progress towards Universal Access

Progress Report **2011**

World Health
Organization

UNAIDS
JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS

UNICEF
UNEP
UNFPA
UNHCR
UNWFP
UNWOMEN
WHO
WORLD BANK

unicef

Fig. 2.1 Number of people living with HIV globally, 1990-2010

Fig. 2.2 Number of people newly infected with HIV globally, 1990-2010

Fig. 2.3 Number of people dying from AIDS-related causes globally, 1990-2010

Fig. 2.4 Number of children 0-14 years old living with HIV globally, 1990-2010

Fig. 1.1 Number of people with access to antiretroviral therapy and the number of people dying from AIDS-related causes, low- and middle-income countries, 2000–2010

Fig. 1.3 Global resources available for HIV programmes in low- and middle-income countries, billions of US dollars, 2002-2010

Source: UNAIDS World AIDS Day report 2011 (25).

Fig. 1.4 Annual number of people newly infected with HIV, 2011-2020 baseline scenario and optimized investment framework

VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV)

O **HIV** infecta as células Tauxiliares (CD4⁺), macrófagos e células dendríticas

➤ Produz doença lentamente progressiva e fatal – **família dos lentivírus dos retrovírus;**

➤ 2 tipos principais: **HIV-1 e HIV-2.**

EVOLUÇÃO DO HIV

Provoca **AIDS** porque destrói o **sistema imune** do hospedeiro, não sendo capaz de erradicar a infecção pelo vírus

Fase inicial: infecção aguda, controlada parcialmente pela imunidade

2ª fase: linfonodos e baço são locais de contínua replicação do HIV e destruição tecidual

EVOLUÇÃO DO HIV

FASES CLÍNICAS DO HIV

Fase da doença

Aspecto Clínico

Doença HIV aguda

**Febre, cefaléia,
inflamação de garganta
com faringite,
linfadenopatia
generalizada, erupções**

Período clínico latente

**Declínio do número de
células T CD4⁺**

AIDS

**Infecções oportunistas
Tumores
Encefalopatia
Síndrome caquetizante**

[Click here for more articles from the Ceccatalli symposium](#)

doi: 10.1111/joim.12050

Synaptic dysfunction in human immunodeficiency virus type-1-positive subjects: inflammation or impaired neuronal plasticity?

■ V. Avdoshina, A. Bachis & I. Mocchetti

From the Laboratory of Preclinical Neurobiology, Department of Neuroscience, Georgetown University Medical Center, Washington, DC, USA

Journal of Internal Medicine, 2013, 273; 454–465

Infecção primária das células do sangue e das mucosas

Infecção instalada nos tecidos linfóides

Síndrome HIV aguda, propagação da infecção por todo o corpo

Viremia

Resposta imune

Controle parcial da replicação viral

Latência clínica

Instalação de infecção crônica; vírus aprisionados nos tecidos linfóides; baixo nível de produção viral

Outras infecções microbianas; citocinas

Aumento da replicação viral

Destruição de tecido linfóide; depleção de células T CD4⁺

Abbas et al., 2003

AIDS

HIV and AIDS

AGENTES INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA (ITR) ANÁLOGOS NUCLEOSÍDEOS (AN-ITR)

- ❖ **Zidovudina (AZT; azidotimidina) - RETROVIR, VIRUSTAT, ZIDOVUDINA**
- ❖ **Didanosina (ddl; didesoxinosina) – VIDEX**
- ❖ **Zalcitabina (ddC; didesoxicitidina) – HIVID**
- ❖ **Estavudina (d4T) – ZERITAVIR**
- ❖ **Lamivudina (3 TC) - EPIVIR, ZEFFIX**
- ❖ **Abacavir – ZIAGENAVIR**

ANÁLOGO NUCLEOTÍDEO

- ❖ **Tenofovir**

NÃO-NUCLEOSÍDEOS (NN-ITR)

- ❖ **Nevirapina – VIRAMUNE**
- ❖ **Delarvidina – RESCRIPTOR**
- ❖ **Efarivenzo - STOCRIN**

Agentes anti-HIV - Inibidores das Proteases (IP)

Atazanavir

Indinavir – CRIXIVAN

Nelfinavir – VIRACEPT

Ritonavir – NORVIR

Saquinavir – INVIRASE

Amprenavir – AGENERASE

Lopinavir - KALETRA

Achieving a cure for HIV infection: do we have reasons to be optimistic?

Valentin Le Douce¹, Andrea Janossy¹, Houda Hallay¹, Sultan Ali¹, Raphael Riclet¹, Olivier Rohr^{1-3†}
and Christian Schwartz^{1,2*†}

HIV E EXERCÍCIO:

Direcionamentos da aula

O **exercício** é seguro para indivíduos portadores do HIV?

Qual a **intensidade, volume, duração e frequência** do exercício para esta população?

Quais as **adaptações** decorrentes do **exercício** em indivíduos com **HIV**?

HIV E EXERCÍCIO: ADAPTAÇÕES E BENEFÍCIOS

HIV E EXERCÍCIO

O **exercício** apresenta potenciais benefícios profiláticos;

Associado ao aumento **massa magra** e melhora da **aptidão cardiovascular**.

HIV E EXERCÍCIO

Exercício está ligado a melhora a imagem corporal;

Importante para indivíduos **infectados com o HIV**

O' Brien et al., 2004

Pode ocorrer redução nas concentrações totais de **colesterol e triacilgliceróis**

Simon et al., 2001

HIV E EXERCÍCIO

Melhora no **VO₂max** e melhoras superiores com intensidade alta comparado a intensidade moderada;

Melhora de parâmetros **psicológicos com o exercício**

Pequena ou nenhuma melhora dos parâmetros imunes **c/ o exercício aeróbico**

ORIGINAL RESEARCH

Kinetics of lactate metabolism after submaximal ergometric exercise in HIV-infected patients

A-M Bauer, T Sternfeld, S Horster, M Schunk, F-D Goebel and JR Bogner

Department of Infectious Diseases, Medizinische Poliklinik, University Hospital of Munich, Munich, Germany

Cinética do metabolismo de lactato após exercício submáximo em pacientes HIV-infectados

INTRODUÇÃO

Indivíduos infectados pelo HIV podem apresentar **toxidade mitocondrial**;

Hiperlactacidemia e esteatose hepática devido ao **tratamento farmacológico**;

Levando a náuseas, fadiga, vômito e perda de peso

Lipodistrofia = atrofia do tecido adiposo;

Concentrações de lactato aumentadas

Células musculares durante o exercício

Concentrações plasmáticas de lactato

Toxicidade mitocondrial

Remoção hepática

- Esteatose, álcool
- DNSAI, metformina
- Co-infecção hepatite

Gliconeogênese hepática

Table 2. Patient characteristics

	Group			
	1	2	3	4
Age (years)	37 (± 10.5)	38 (± 9.8)	48 (± 8.8)	50 (± 16)
BMI	23 (± 1.9)	24 (± 2.9)	25 (± 4.3)	23 (± 2.6)
CD4 count (cells/ μ L)	–	418 (± 130)	377 (± 132)	472 (± 247)
Duration of HIV (years)	–	5 (± 6.2)	10 (± 5.4)	8 (± 4.4)
Years on HAART	–	–	5 (± 3.2)	5 (± 4.3)
Lipodystrophy	–	–	4	2
Fitness score	67 (± 14)	59 (± 22)	55 (± 19)	53 (± 19)
Hepatitis B	–	2	–	1
Hepatitis C	–	1	–	–
Lactate baseline (mmol/L)	1.4 (± 0.4)	1.5 (± 0.6)	1.5 (± 0.3)	2.8 (± 0.5)
AST (U/L)	10 (± 3.7)	13 (± 4.5)	17 (± 18)	11 (± 2.7)
ALT (U/L)	15 (± 9.8)	20 (± 11.6)	22 (± 10.9)	19 (± 8.4)
GGT (U/L)	11 (± 2.9)	20 (± 18)	41 (± 25.2)	45 (± 31.7)
AP (U/L)	83 (± 24.4)	86 (± 23.8)	110 (± 40.8)	99 (± 26.6)
Cholesterol (mg/dL)	186 (± 38.7)	167 (± 29.4)	217 (± 58.2)	220 (± 51.4)
Triglycerides (mg/dL)	104 (± 34.6)	109 (± 54.4)	227 (± 197.7)	498 (± 556.5)

Group 1 ($n = 10$), healthy controls; group 2 ($n = 11$), HIV-infected treatment-naïve patients; group 3 ($n = 15$), HIV-infected patients on HAART; group 4 ($n = 9$), HIV-infected patients on HAART with hyperlactataemia.

CONCLUSÕES DO ESTUDO

- ❖ Existem diferenças no metabolismo do **lactato** entre indivíduos **saudáveis e portadores do HIV**;
- ❖ O HIV pode induzir a **hiperlactacidemia** associado também ao tratamento farmacológico;
- ❖ Possível **remoção comprometida** do lactato (inclusive após o exercício).

Exercise Training in HIV-1-Infected Individuals with Dyslipidemia and Lipodystrophy

LUCRECIA TERRY¹, EDUARDO SPRINZ², RICARDO STEIN¹, NICIA B. MEDEIROS², JARBAS OLIVEIRA², and JORGE P. RIBEIRO^{1,3}

¹Cardiology and ²Internal Medicine Divisions, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, BRAZIL; and ³Department of Medicine, School of Medicine, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, BRAZIL

Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 38, No. 3, pp. 411–417, 2006.

PROTOCOLO DE TREINAMENTO

**36 sessões de treinamento (12 semanas) c/
duração de 1h cada, 3 x semana.**

30min, corrida em esteira a 70-85% da Fcmax

A photograph of a gym with various exercise machines and a tiled floor. A large black oval with a green glow is overlaid on the center, containing white and yellow text.

HIV: TREINAMENTO
DE FORÇA +
TREINAMENTO
AERÓBIO

Effects of exercise training and metformin on body composition and cardiovascular indices in HIV-infected patients

**Susan D. Driscoll^a, Gary E. Meininger^a, Mark T. Lareau^b,
Sara E. Dolan^a, Kathleen M. Killilea^a, Colleen M. Hadigan^a,
Donald M. Lloyd-Jones^c, Anne Klibanski^d, Walter R. Frontera^e and
Steven K. Grinspoon^{a,d}**

From the ^aProgram in Nutritional Metabolism, ^bPhysical Therapy, ^cCardiology, and ^dNeuroendocrine, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts, USA and the ^eDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Spaulding Rehabilitation Hospital and Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA.

AIDS 2004, **18**:465–473

PROTOCOLO DE TREINAMENTO

2 sem = 20min a 60% Fcmax, depois 30min até a 12ª semana a 75% Fcmax - bicicleta estacionária

TF: 1) extensão do quadril, 2) remada unilateral, 3) extensão dos joelhos, 4) flexão do cotovelo, 5) flexão dos joelhos e 6) chest press

PROTOCOLO DE TREINAMENTO

Fase concêntrica e excêntrica – 6-10s, 3x10RM, 2-3s entre as rep, 2min entre séries e 4 min entre os exercícios

2 sem = 60% de 1RM + 2 sem = 70% de 1RM

Depois 80% de 1RM até o final da 12^a semana

Fig. 2. Comparison of change from baseline to end of metformin and exercise training intervention for measures of strength. Data expressed as median (dark line) with (25–75 percentile) interquartile ranges (box). *P*-value for comparison of median change between groups by the Wilcoxon's Rank-Sum Test. 1 RM, one repetition maximum; Leg Ext., leg extension exercise. Lat Pull, lateral pull-down exercise. White bars, metformin only group. Grey bars, metformin and exercise training group.

CONCLUSÕES DO ESTUDO

Apesar da **tendência para redução**, colesterol, LDL e TAGs não reduziram no grupo exercício + metformina;

TA e TF + metformina = melhora superior nos **parâmetros de doença coronariana**, redução de PA e RCQ;

TA e TF foram bem **tolerados**, melhora força, massa magra e aptidão cardiovascular, podendo ser usado como forma de **tratamento para HIV**.